République Tunisienne
Ministère de la Santé

Bip Bip N°5 du 25 mai 2022

Service de Recueil et Analyse des effets indésirables


Centre National Chalbi BELKAHIA de Pharmacovigilance (CNPV)

« Signalement des Manifestations post vaccinales indésirables (MAPI) des vaccins COVID-19 »

Statistiques d'utilisation des vaccins anti-COVID-19

Total des doses utilisées


13 174 179



Statistiques au 25/105/2022

Suivi de 936 femmes enceintes vaccinées contre COVID-19

Répartition selon le type de vaccin reçu




Statistiques des MAPI

Total = 3115 MAPI


Nombre de MAPI analysées= 2609

Données individuelles manquantes= 506


Signalements par tranche d'âge et par genre




Age: 13 à 98 ans




Répartition selon le nombre de doses reçues




Répartition selon le terme de grossesse lors de la vaccination




Signalements selon les vaccins utilisés




Proportion des MAPI en fonction du nombre de doses utilisées par vaccin




Issue de la grossesse




Répartition des MAPI selon la classification MedDRA






Parmi les nouveaux-nés, 99% étaient en bonne santé apparente
Dans 1% des cas, l'investigation est en cours.

Les cas graves signalés (219 cas)





Statistiques du 25/05/2022

Principales Constatations

- A la date du 25 mai 2022, la prévalence des MAPI de 0,023%.
- Les MAPI bénignes ont représenté 93% des MAPI. Les troubles généraux et les anomalies au site d'administration (réactogénicité) étaient les MAPI les plus fréquentes (44%)
- La fréquence des MAPI graves était de 7% (dont 11% d'infection COVID).
- Parmi les femmes enceintes, certaines ont reçu par inadvertance un vaccin autre que le vaccin Pfizer BioNTech.