République Tunisienne
Ministère de la Santé

Bip Bip n°7 Octobre 2024

Bulletin du Service de Recueil et d'Analyse des effets indésirables

Centre National Chalbi BELKAHIA de Pharmacovigilance





Dans le cadre du rapprochement des services de santé aux citoyens, le **Service de Recueil et d'Analyse des Effets Indésirables** du **Centre National Chalbi Belkahia de Pharmacovigilance** a renforcé son activité au niveau des régions du nord en instaurant une consultation de pharmacovigilance dans les gouvernorats de Bizerte et de Nabeul. Cette activité a démarré le 19 janvier 2024 à Nabeul et le 02 mars à Bizerte.

À Nabeul :

- **Lieu :** L'hôpital régional Mohamed TLATLI
- **Prise de Rendez-vous :** sur place à l'hôpital Mohamed TLATLI, ou à distance au niveau des structures sanitaires du Gouvernorat de Nabeul
- **Contact:** 52 456 296

À Bizerte :

- **Lieu :** Hôpital régional Habib BOUGATFA
- **Prise de Rendez-vous :** sur place à l'hôpital Habib BOUGATFA ou à distance au niveau des structures sanitaires du Gouvernorat de Bizerte
- **Contact :** 29 726 768

- Le nombre de consultants a atteint jusqu'à **la date du 30 septembre 2024** :

  Nabeul = 139 patients

  Bizerte = 73 patients

Congrès de pharmacologie 2024

Le **2ème congrès National de pharmacologie** se tiendra du 10 au 12 octobre 2024 à Hammamet.

Parmi les thèmes abordés:

- **Vaccinovigilance:** panel de discussion concernant la nouvelle stratégie de surveillance
- **Cosmétovigilance:** réglementation, contrefaçons et rôle de l'industriel
- **Pharmacovigilance des biosimilaires**



Enquête Fercayl® (fer dextran)

Le Centre National Chalbi Belkahia de Pharmacovigilance a été sollicité par la Direction de la Pharmacie et du Médicament à propos d'une réclamation d'événements indésirables survenus à la suite de l'administration du FERCAYL® 100mg/2ml (fer dextran solution injectable).

Le Service de Recueil et d'Analyse des Effets indésirables a mené l'enquête. La collecte et l'analyse des évènements indésirables a permis d'identifier des réactions mineures à modérées avec des constantes hémodynamiques stables dans tous les cas. Ces évènements sont très probablement liés à une réaction à la perfusion. Ces réactions sont plus susceptibles de se produire avec des vitesses de perfusion plus rapides, De plus, la quantité de fer par ml est plus importante dans la présentation Fercayl® 100mg/2ml par rapport aux autres présentations habituelles du fer injectable commercialisés en Tunisie (IV-Fer® et Feroven ®).

Comité de rédaction: Pr Sihem El Aidli, Pr Ag Imen Aouinti, Dr Dorra Ben Said, Pr Riadh Daghfous